


Clamidia

En las mujeres, si no se recibe un tratamiento, la clamidia se puede extender al útero y las trompas de Falopio y causar una enfermedad pélvica inflamatoria (PID, por sus siglas en inglés).

En los hombres, la infección a veces se propaga al conducto que transporta espermatozoides desde los testículos generando fiebre y dolor. Además, si no se recibe un tratamiento, aumentan las posibilidades de contraer o transmitir VIH.

Hazte la prueba en The DOCK

Las pruebas de clamidia, gonorrea o sífilis tienen un valor de solo USD 25. Esto incluye el análisis y el tratamiento inicial. Las pruebas de VIH y Hepatitis C son GRATIS.



THE DOCK
Powered by Desert AIDS Project

1695 N. Sunrise Way (en Vista Chino)
Palm Springs, CA 92262

(760)-992-0492

Se Habla Español



Hazte la prueba en The DOCK

THE DOCK
Powered by Desert AIDS Project

¿Cómo se transmite la clamidia?

La clamidia se puede contagiar mediante una práctica sexual vaginal, anal u oral con una persona infectada.

Las mujeres embarazadas con clamidia puede transmitir la enfermedad al bebé durante el nacimiento.

¿Estás en riesgo de contraer clamidia?

Cualquier persona que tenga sexo puede contraer clamidia mediante una práctica sexual vaginal, anal u oral sin protección.

Cómo evitar contraer la clamidia

- Mantener una relación mutuamente monógama con una pareja que se haya realizado la prueba de ITS y haya obtenido resultados negativos.
- Utilizar prácticas sexuales seguras

¿Cuáles son los síntomas de la clamidia?

La mayoría de las personas que tienen clamidia no presentan síntomas. Si bien esta

enfermedad no manifiesta síntomas, puede dañar el sistema reproductivo.

Los síntomas en las mujeres pueden ser:

- Una secreción vaginal anormal;
- Una sensación de ardor al orinar.

Los síntomas en los hombres pueden ser:

- Una secreción del pene;
- Una sensación de ardor al orinar;
- Dolor o hinchazón en uno o los dos testículos.

Hombres y mujeres también pueden contraer clamidia a través del recto ya sea mediante sexo anal receptivo o mediante contagio de otro sitio infectado (como la vagina). Si bien generalmente estas infecciones no causan síntomas, pueden provocar:

- Rectal pain;
- Secreciones;
- Sangrado.

¿Con qué frecuencia se debe realizar la prueba de clamidia?

Se recomienda realizar la prueba una vez al año si:

- Eres una persona sexualmente activa
- Tienes sexo con una nueva pareja o varias parejas
- Eres un hombre que tiene sexo con hombres
- Tienes VIH

- Te han obligado a tener relaciones sexuales contra tu voluntad

Es común que la infección de la clamidia se repita.

Debes realizar la prueba nuevamente unos tres meses después de finalizar el tratamiento, por más que tu pareja sexual haya sido tratada.

Cómo se realizan las pruebas de clamidia

Se puede realizar un análisis de orina o tomar una muestra dentro del pene en el caso de los hombres y dentro del cuello uterino para las mujeres. Las muestras se analizan en el laboratorio.

¿Se puede curar la clamidia?

Sí, la clamidia se puede curar si se realiza el tratamiento adecuado. Es importante que tomes toda la medicación recetada por el médico para curar la infección.

¿Qué sucede si no se recibe un tratamiento para la clamidia?

Generalmente los primeros efectos nocivos de la clamidia no se detectan. Sin embargo, esta enfermedad puede causar serios problemas de salud.