


# Gonorrea

- Embarazo ectópico (embarazo fuera del útero);
- Infertilidad (imposibilidad de quedar embarazada);
- Dolor abdominal o pélvico duradero.

En los hombres, la gonorrea puede causar dolor en los conductos de los testículos. En pocos casos pueden causar esterilidad.

## Después de recibir el tratamiento de la gonorrea, ¿cuándo se puede volver a tener sexo?

Debes esperar siete días después de finalizar con todos los medicamentos para volver a tener sexo.



## Hazte la prueba en The DOCK

Las pruebas de clamidia, gonorrea o sífilis tienen un valor de solo USD 25. Esto incluye el análisis y el tratamiento inicial. Las pruebas de VIH y Hepatitis C son GRATIS.

**THE DOCK**  
Powered by Desert AIDS Project

1695 N. Sunrise Way (en Vista Chino)  
Palm Springs, CA 92262

(760)-992-0492

Se Habla Español



## Hazte la prueba en The DOCK

**THE DOCK**  
Powered by Desert AIDS Project

## ¿Cómo se transmite la gonorrea?

La gonorrea se puede contagiar mediante una práctica sexual vaginal, anal u oral con una persona infectada. Además, una mujer embarazada con gonorrea puede transmitir la enfermedad al bebé durante el nacimiento.

## ¿Estás en riesgo de contraer gonorrea?

Cualquier persona sexualmente activa puede contraer gonorrea mediante una práctica sexual vaginal, anal u oral.

## Cómo evitar contraer gonorrea

Las personas sexualmente activas pueden reducir las posibilidades de contraer infecciones de transmisión sexual, ITS, al:

- Mantener una relación mutuamente monógama con una pareja que se haya realizado la prueba de ITS y haya obtenido resultados negativos.
- Utilizar prácticas sexuales seguras

## ¿Cuáles son los síntomas de la gonorrea?

Algunos hombres infectados con gonorrea no presentan ningún síntoma. Sin embargo, los hombres que tienen síntomas pueden experimentar:

- Una sensación de ardor al orinar;
- Una secreción del pene de color blanco, amarillo o verde;
- Dolor o hinchazón en los testículos (aunque esto es menos común).

### Los síntomas en las mujeres pueden ser:

- Una sensación de ardor o dolor al orinar;
- Aumento del flujo vaginal;
- Sangrado vaginal entre dos períodos.

Es posible que las infecciones rectales no presenten síntomas o presenten los siguientes síntomas tanto en hombres como en mujeres:

- Secreción;
- Picazón anal;
- Malestar;
- Sangrado;
- Deposiciones dolorosas.

## ¿Con qué frecuencia se debe realizar la prueba de gonorrea?

### Se recomienda realizar la prueba una vez al año si:

- Eres una persona sexualmente activa
- Tienes sexo con una nueva pareja o varias parejas
- Eres un hombre que tiene sexo con hombres
- Tienes VIH
- Te han obligado a tener relaciones sexuales contra tu voluntad

## Cómo se realizan las pruebas de gonorrea

Se puede realizar un análisis de orina o tomar una muestra dentro del pene en el caso de los hombres y dentro del cuello uterino para las mujeres. Las muestras anales se toman en aquellas personas que han tenido sexo anal.

## ¿Se puede curar la gonorrea?

Sí, la gonorrea se puede curar si se realiza el tratamiento adecuado. Es importante que tomes toda la medicación recetada por el médico para curar la infección.

Si los síntomas continúan por más de algunos días después de recibir el tratamiento, debes recurrir al profesional médico que te atiende para que realice un nuevo control.

## ¿Qué sucede si no se recibe un tratamiento para la gonorrea?

Si la gonorrea no se trata puede causar problemas de salud serios y permanentes.

En las mujeres, la gonorrea puede causar enfermedad pélvica inflamatoria (PID, por sus siglas en inglés). Esta enfermedad puede causar las siguientes complicaciones:

- Formación de un tejido cicatrizante que obstruye las trompas de Falopio;