Su Navegador de PrEP en DAP Health

Si está interesado en PrEP, comuníquese con un navegador de PrEP al 760.656.8400.

También puede hablar con cualquier enfermera/o o enfermera/o practicante durante su visita si desea conversar sobre qué tipo de PrEP sea la adecuada para usted.

Si no tiene seguro de atención médica o si necesita asistencia financiera, un navegador de PrEP también puede explicarle sus opciones, ayudarle a obtener acceso y responder preguntas sobre cómo encontrar un médico o trabajar con su farmacia.

Todas las visitas de PrEP y los análisis de laboratorio realizados en las Clínicas de Bienestar Sexual de DAP Health en Palm Springs e Indio son gratis para todos los pacientes.

Debe tomar PrEP para la prevención de ITS si:

- Tiene 18 años o más.
- Es sexualmente activo (o planea serlo pronto).
- Es VIH negativo y está en PrEP para prevenir el VIH.
- Es VIH positivo y está en terapia antirretroviral (TAR).

Debe tomar PrEP para la protección contra el VIH si:

- Tiene 18 años o más.
- Es sexualmente activo (o planea serlo pronto).
- Es VIH negativo.

DAP Health

760.323.1999
daphealth.org

01/2023

PrEP

Profilaxis Previa a la Exposición

Reduciendo Su Riesgo de Contraer el VIH y las ITS

Conozca Todas Sus Opciones

DAP Health

¿Qué es PrEP?

Profilaxis previa a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés) son diferentes medicamentos que pueden reducir sus posibilidades de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

PrEP Para la Prevención de ITS

Conocida más comúnmente como Doxy PrEP, la doxiciclina se puede usar a diario para reducir las posibilidades de infectarse con clamidia o sífilis. Algunos estudios también muestran su efectividad en la prevención de la gonorrea.

La dosis es una tableta de 100mg tomada una vez al día. Doxy PrEP requiere pruebas de seguimiento de ITS cada tres meses.

PrEP Para la Prevención del VIH

Administrada por vía oral en una sola píldora diaria — o mediante una sola inyección cada dos meses — la PrEP puede reducir el riesgo de contraer el VIH.

Antes de comenzar con la PrEP, deberá hacerse la prueba del VIH, las ITS, la función renal y la hepatitis B y C.

Tarda al menos una semana de tomar PrEP antes de que esté protegido para el sexo anal y tres semanas para el sexo vaginal.

Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), cuando se toma según lo prescrito, la PrEP reduce el riesgo de infección por VIH a partir de la actividad sexual en más del 99% y en al menos un 74% para quienes usan drogas intravenosas.

PrEP Oral Para la Prevención del VIH

Actualmente hay dos diferentes medicamentos orales disponibles: Truvada y Descovy.

La PrEP oral requiere pruebas de seguimiento del VIH, las ITS y la función renal en un laboratorio cada tres meses.

PrEP Inyectable Para la Prevención del VIH

Si no desea tomar medicamentos todos los días, una inyección de Apretude cada dos meses puede reducir su riesgo de contraer el VIH.

La PrEP inyectable está cubierta por Medi-Cal, así como por algunos planes de seguro privados y de Medicare. Sin embargo, algunos planes pueden requerir que acuda a su proveedor de atención primaria para obtener el PrEP inyectable.

Posibles Efectos Secundarios

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Hable con su proveedor antes de comenzar cualquier medicamento.

Visitas de Seguimiento

Todas las opciones de PrEP requieren visitas de seguimiento con el personal clínico para pruebas de ITS y resurtidos de medicamentos.